

الهيدروكربونات

Hydrocarbons

4- المركبات

الأروماتية


المقدمة Introduction

يطلق لفظ المركبات الأروماتية عموماً على المركبات الكيميائية العضوية الحلقية غير المشبعة وذات الخصائص المميزة. قد تكون هذه المركبات متجانسة أي أن حلقاتها مكونة من ذرات الكربون و الهيدروجين فقط وقد تكون غير متجانسة يدخل في تركيب حلقاتها ذرة أو أكثر من ذرة أخرى غير ذرات الكربون والهيدروجين مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت.


يستعمل المصطلح الروماني (Aromatic) عادة في وصف مشتقات البنزين (ذات الروائح العطرية) المستخلصة من النباتات إذ تحتوي هذه المركبات عادة على مجموعات مختلفة مثل OCH_3 - ، COOH - ، COOCH_3 - - - إلخ متصلة بحلقة تحمل الصيغة الجزيئية C_6H_5 - إلا أنه مع الوقت تم اكتشاف مركبات أخرى تحتوي على الحلقة نفسها C_6H_5 - ، وهذه أما أن تكون عديمة الرائحة أو ذات رائحة كريهة ، لذا فقد تم التخلي في هذا العرض عن المصطلح العربي (عطرية) ليطلق لفظ المصطلح اللاتيني كما هو أي أروماتي .

البنزين وتركيبه Benzene structure

يعد البنزين C_6H_6 أبسط المركبات الأروماتية وفي البنزين تتصل ذرات الكربون مع بعضها على شكل سداسي منتظم تتبادل فيه الروابط المفردة والمزدوجة. والبنزين جزيء مستو، تقع فيه ذرات الكربون والهيدروجين في مستوى واحد ، إذ تستعمل ذرات الكربون أفلاك sp^2 المهجنة . وجميع روابط كربون - كربون في البنزين متساوية في الطول وتبلغ (139°A) ، وهي أطول من الرابطة المزدوجة $\text{C}=\text{C}$ (132°A) ، وأقصر من الرابطة المفردة $\text{C}-\text{C}$ (154°A) . وأما الصيغة البنائية للبنزين فقد مثلها الكيميائي الألماني كيكيولية Kekule كما يلي :



منتظم ويمثل الشكلان I ، II بنائي رنين . والبناء الحقيقي للبنزين هو مزيج Hybrid من البنائين I ، II . لذلك يمثل البنزين بشكل سداسي وبداخله حلقة للدلالة على أن الإلكترونات غير متركزة أو منتشرة Delocalized




الخواص الأروماتية Aromatic properties

تتلخص الخواص العامة للمركبات الأروماتية بالنقاط التالية :


١. أن تكون المركبات العضوية على شكل حلقي وتكون ذرات الكربون في مستوى واحد (حلقة مستوية) حتى يمكن تداخل دارات P بشكل أشمل ويسمح بالطنين (تحرك الإلكترونات) بشكل مستمر .
٢. أن تحتوي على روابط ثنائية متبادلة .
٣. ألا تكون ذرات الكربون المكونة للحلقة مفصولة بذرة كربون مشبعة .
٤. أن يطبق عليها قانون هيوكل (Huckels rule) الذي يحدد عدد الإلكترونات السالبة أو المكونة لروابط π ويأخذ الصيغة التالية $(4n+2)$ حيث $(n = 0, 1, 2, 3, \dots)$ فمثلا حلقة البنزين التي يوجد فيها ستة إلكترونات (مكونة لثلاث روابط π) تتماشى مع القانون حيث أنه بالتعويض عن قيمة n بـ (١) نجد أن العدد الناتج مساويا (٦) كما يلي :

$$(4 \times 1 + 2) = 6$$


لذا ويمكن تطبيق القانون السابق على بعض المركبات الحلقية (المتجانسة وغير المتجانسة) لاستنتاج خاصيتها الأروماتية كما يلي :




Benzen
 $n = 1$




Naphthalene
 $n = 2$




Anthracene
 $n = 3$



Phenanthrene
 $n = 3$
 $4(3) + 2 = 14 \pi \text{es}$



Pyridine
 $n = 1$
 $4(1) + 2 = 6 \pi \text{es}$



Pyrrole
 $n = 1$
 $4(1) + 2 = 6 \pi \text{es}$


الخواص الفيزيائية للبنزين Benzene physical properties

البنزين سائل عديم اللون ، ذو رائحة عطرية مميزة . يغلي عند ٨٠ °م وإذا برد تحول إلى بلورات شفافة تنصهر عند ٤.٥ °م وهو شحيح الذوبان في الماء لكنه يمتزج مع معظم المذيبات العضوية حيث إنه يعتبر جزيئاً غير قطبي وذلك لأنه مكون من هيدروجين وكربون فقط إلا أنه نسبياً أعلى قطبية من الهيدروكربونات المشبعة لاحتوائه على إلكترونات π .


تسمية مشتقات البنزين Nomenclature of benzene derivatives

مشتقات البنزين هي نواتج استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر بذرة أو مجموعة أخرى فعند تسمية هذه المشتقات هناك ثلاث حالات هي كما يلي :


١. عند استبدال ذرة هيدروجين بذرة أو مجموعة أخرى فتكون التسمية على النحو التالي :
جرت العادة بذكر اسم المجموعة المرتبطة بحلقة البنزين أولاً ثم يختتم الاسم بكلمة بنزين :




Bromobenzene



Iodobenzene




Ethylbenzene




Nitrobenzene


وقد تأخذ هذه المشتقات أسماء شائعة مثل :




Toluene




Styrene




Cumene




Benzaldehyde




Phenol




Benzoic acid




Acetophenone



Aniline




Benzenesulfonic acid




Anisole

وفي بعض الأحيان يستحسن أن تعتبر حلقة البنزين هي المجموعة البديلة ، وتأخذ الاسم فينيل phenyl خاصة إذا كانت المجموعة المرتبطة بحلقة البنزين ليس لها اسم شائع أو بسيط .




2-Phenylbutane




2-Phenylethanol


أما حين تستبدل ذرة هيدروجين واحدة في مجموعة ميثيل التولوين فتسمى تلك المجموعة Benzyl وفي حالة استبدال ذرتي هيدروجين تسمى Benzal ، أما حين استبدال ثلاث ذرات هيدروجين فتسمى Benzo.



Benzylchloride




Benzalchloride




Benzotrichloride


٢. عندما تحمل حلقة البنزين مجموعتين بديلتين فإنه يتوقع وجود ثلاث مركبات تبعا لترتيب هاتين المجموعتين على الحلقة . ويطلق على المجموعتين المتجاورتين المقطع أورثو (O) ortho وعلى المجموعتين اللتين تفصلهما ذرة كربون واحدة المقطع meta (m) أما المجموعتان المتقابلتان فيطلق عليها المقطع بارا (p) para . وعندما تكون المجموعتان مختلفتين فتسميان بترتيب المجموعتين بالحروف الأبجدية . ثم يختتم الاسم بكلمة Benzene . أو قد تذكر مجموعة واحدة ، ويختتم الاسم باسم مشتق البنزين ، كما في الأمثلة التالية :




O-dichlorobenzene




m-chloroethylbenzene




p-fluoroiodobenzene



m-nitrotoluene




m-bromobenzoic acid




o-chlorophenol


وفي حالة وجود مجموعتي -CH₃ فإنها تتبع التسمية الشائعة كما يلي :



o-xylene




m-xylene



p-xylene


أما إذا كانت هناك ثلاث مجموعات بديلة أو أكثر فعندئذ نرقم حلقة البنزين



1,2,3-trichlorobenzene

وليس


(1,2,6-trichlorobenzene)



3-chloro-5-fluoronitrobenzene

(مجموعة النيترو يجب أن تقع على ذرة


الكربون رقم ١)



2,4,6-tribromophenol

(مجموعة الفينول يجب أن تقع على ذرة

الكربون رقم ١)





2,4,6-trinitrotoluene (TNT)

(مجموعة الميثيل يجب أن تقع على ذرة

الكربون رقم ١)

يوجد البنزين ، مع غيره من المركبات الأروماتية مثل التولوين والزيلين والفينول وغيرها ، في قطران الفحم الذي ينتج من التقطير الإتلافي للفحم الحجري . وقطران الفحم الناتج من تكثيف بعض الأجزاء المتطايرة عند التقطير الإتلافي للفحم في عدم وجود أكسجين في الهواء كما يمكن تحضير البنزين ومشتقاته من البترول بطريقة تحويل المركب ألا إلى مركب أروماتي ، وذلك من معاملة جزء خاص من قطارة البترول بالتسخين في وجود عوامل مساعدة.



تفاعلات المركبات الأروماتية:


هناك نوعان من تفاعلات المركبات الأروماتية ، تشمل تفاعلات النوع الأول ما يتم على السلسلة الجانبية الموجودة على الحلقة ، وتشمل تفاعلات النوع الثاني ما يتم على نواة الحلقة نفسها .

١. تفاعلات السلسلة الجانبية لألكيلات البنزين :

من أهم تفاعلات السلسلة الجانبية لألكيلات البنزين تفاعلات الهلجنة وتفاعلات الأكسدة ويمكن توضيح هذين التفاعلين كما يلي :


أ. تفاعلات الهلجنة Halogenation :

بما أن ألكيلات البنزين تحتوي على جزء أليفاتي وجزء أروماتي ، فإننا نتوقع أن يخضع الجزء الأليفاتي (السلسلة الجانبية الألكيلية) لتفاعلات استبدال جذور حرة ، وهي التفاعلات المميزة للالكانات ، وذلك في وجود الضوء والحرارة لتوليد الجذور الحرة (ذرات الهالوجين) ، بينما يخضع الجزء الأروماتي لتفاعلات الاستبدال الأروماتي الإلكتروفيلي ، كما في حالة البنزين وذلك في وجود حموض لويس كعوامل مساعدة . وبذلك يمكن أن نتحكم في توجيه الهالوجين عن طريق اختيار الظروف المناسبة ، فمثلا عند إمرار غاز الكلور في التولوين المغلي في وجود الضوء يتم الإحلال على السلسلة الجانبية أما في غياب الضوء وفي وجود كلوريد الحديد كعامل مساعد يتم الإحلال على حلقة البنزين .



ب. أكسدة السلسلة الجانبية :


بالرغم من أن حلقة البنزين وكذلك الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة صعبة التأكسد بواسطة برمنجنات البوتاسيوم أو ثاني كرومات البوتاسيوم إلا أن حلقة البنزين تجعل السلسلة الجانبية تتأكسد إلى مجموعة كربوكسيلية . وبغض النظر عن طول السلسلة الجانبية فإن الناتج هو حمض البنزويك وإذا تعددت المجموعات الألكيلية المرتبطة بحلقة البنزين فإن كلاً منها تتأكسد إلى مجموعة كربوكسيلية.



2- تفاعلات على حلقة البنزين

أ- هدرجة ألكيلات البنزين :


يمكن هدرجة ألكيلات البنزين كما هو الحال في البنزين ، وذلك في وجود عامل مساعد مثل النيكل والبلاديوم والبلاتين ، ليعطي الكيل سيكلوهكسان . فمثلاً يمكن هدرجة Ethylbenzene إلى Cyclohexane .




الاستبدال الأروماتي الإلكتروفيلى :

جزئى البنزين غير مشبع إلى حد كبير (وكذا الحلقات الأروماتية الأخرى) فإنه من المتوقع أن يزىل لون البروم فى رباعى كلوريد الكربون عن طريق تفاعلات الإضافة إلى الرابطة الثنائية ، كما أنه من المتوقع أن يزىل لون برمنجنات البوتاسيوم عن طريق تفاعلات الأكسدة ، وأن يتفاعل مع الهيدروجين فى وجود عامل حفز ، إلا أن أيا من تفاعلات الإضافة وتفاعلات الأكسدة التى تحدث فى الألكينات لا تتم فى حالة البنزين . وذلك إلى ثبات الروابط المضاعفة فى البنزين نتيجة للتأرجح ، ولكن بشيء من التعديل فى ظروف التفاعلات يحدث نوع من التفاعلات تسمى تفاعلات الاستبدال أو الإحلال ، وهذه لا تتم إلا بوجود عامل حفز له القدرة على استقطاب أو تحرير العامل الإلكتروفيلى ليصبح ذا مقدرة على التفاعل مع الحلقة الأروماتية ، هذا وتشمل تفاعلات الاستبدال على الحلقة الأروماتية ما يلى :


١ - ألكلة (فريدل - كرافت) Alkylation




٢ - أسيلة (فريدل - كرافت) Acylation




٣ - الهلجنة Halogenation



٤ - النيترة Nitroation








٥ - السلفنة السلفنه



Sulfonation

أسئلة حول الموضوع

س١ : اذكر أسماء المركبات التالية :



س٢ : ارسم التركيب البنائي لكل من المركبات التالية :

a) 1,3,5-trichloro benzen

b) m-bromotoluene

c) p-bromoniro benzene

d) Isopropyl benzene

e) 4-bromo-2,3-dinitrotoluene

f) m-chloro benzoic acid