

ثالث وقاية فسلجة حشرات / أ.م.د.حسين طاهر كريم / كلية الزراعة / جامعة واسط

أعضاء الإخراج في الحشرات

أعضاء الإخراج The excretory organs

تقوم أعضاء الإخراج في الحشرات بتهيئة وسط داخلي ثابت نسبياً لأنسجة الجسم وذلك عن طريق عدة عمليات منها عمليتي التخلص من فضلات تحلل البروتين النيتروجينية، وتنظيم التركيب الأيوني للدم. وأعضاء الإخراج الرئيسية

هي أنابيب مليجي ويساعدها في ذلك الأجسام الدهنية والخلايا الكلوية.

١ - أنابيب مليجي Malpighian tubes:

توجد هذه الأنابيب في الغالبية العظمى من الحشرات وهي عبارة عن أنابيب رفيعة طويلة أعورية وتقع في التجويف

الدموي حيث يغمرها الدم وتفتح من قاعدتها في الجهاز الهضمي بالقرب من موضع اتصال المعي الخلفي بالمعي المتوسط.

وتظل الأطراف الأعورية لهذه الأنابيب حرة إلا أنها في بعض الحشرات تلتصق بالمعي الخلفي إلتصاقاً وثيقاً كما في يرقات حرشفية الأجنحة.

ينتشر على سطح أنابيب مليجي شبكة غزيرة من القصيبات الهوائية الدقيقة تعمل تفرعاتها الكبيرة على احتفاظ تلك الأنابيب بجسم الحشرة.

تنشأ أنابيب مليجي من الإكتودرم، ويختلف عددها باختلاف الحشرات ولكنه غالباً ما يكون ثابتاً في معظم الرتب وتوجد في أزواج أو

مضاعفات الأزواج (٤ في ذات الجناحين، ٤-٦ في غمدية الأجنحة، ٦ في حرشفية الأجنحة، أكثر من مائة في غشائية الأجنحة).

وقد تشذ بعض الحشرات عن ذلك حيث يوجد منها ٥ أنابيب في البعوض وتنعدم في حشرات المن. ويلاحظ أن طول أنابيب مليجي

يتناسب عكسياً مع عددها حيث يزداد طولها كلما قل عددها والعكس. أما من حيث شكل أنابيب مليجي فهي عبارة عن أنبوبة

بسيطة إلا أنها قد تكون متفرعة كما في دودة الشمع. تفتح إنبوبة مليجي في القناة الهضمية كل بفتحة مستقلة كما في الصرصور

ولكن في بعض الحشرات تتصل أنابيب مليجي ببعضها كل اثنين أو ثلاثة في مجموعة تفتح في انتفاخ عام يعرف بالمثانة البولية التي

تفتح بدورها في المعي الخلفي كما في يرقات الحشرات حرشفية الأجنحة.

تظهر أنبوبة مليجي في قطاعها العرضي مكونة من ٣-٨ خلايا طلائية في طبقة واحدة ولكل خلية من هذه الخلايا من جانبها المحدد

لتجوييف الأنبوبة حافة مخططة . وهذا التخطيط عبارة عن خيوط سيتوبلازمية . تتركز الخلايا من الخارج على غشاء قاعدي يحيط به

غلاف بريتنوني مزود بألياف عضلية.

٢- الجسم الدهني: Fat body

يتكون من كتل أو فصوص غير منتظمة الشكل وخلاياه مستديرة أو عديدة الأوجه وبها تجاوييف وتحتوي على مواد مختلفة ويأخذ

الجسم الدهني ألواناً مختلفة. ويوجد في معظم الحشرات في طبقتين طبقة خارجية وتعرف بالطبقة الجدارية وطبقة أخرى تحيط

بالقناة الهضمية والأعضاء الأخرى وتعرف بالطبقة الحشوية، ويوجد نوعان رئيسيان من الخلايا بالجسم الدهني هي:

أ- خلايا مغذية Trophocytes:

وتكون أغلبية الخلايا حيث تقوم بتركيب وتخزين الغذاء الاحتياطي من الدهن والبروتين والنشا الحيواني لوقت الحاجة عند الجوع

أو الانسلاخ أو التحول.

ب- خلايا اليورات Urate cells:

وهي قليلة وتنتشر أحياناً بين الخلايا المغذية وتعمل على استخلاص بلورات حمض اليوريك من الدم وترسيبه داخلها لحين التخلص منها.

٣- الخلايا الكلوية: Nephrocytes

وهي عبارة عن مجموعات من الخلايا توجد مبعثرة أو متجمعة في أماكن معينة من الجسم. والخلايا الكلوية لها أكثر من نواة ولها

خاصية اختزان المواد المتخلفة، وهي تكون في مجموعتين رئيسيتين:

أ- الكلويات الظهرية أو حول القلبية: Dorsal or pericardial nephrocytes

وتعرف الكلويات الظهرية باسم الخلايا حول القلبية وهي عبارة عن سلسلتين من الخلايا متراصتين في خط طولي على جانبي القلب

في التجوييف الدموي حول القلبي . وتوجد في الأطوار غير البالغة والكاملة لمعظم الحشرات.

ب- الكلويايات البطنية: Ventral nephrocytes

وهي عبارة عن سلسلة من خلايا معلقة في التجويف الحشوي تحت المعى الأمامي ويتصل طرفها بالغدد اللعابية ، وتظهر بوضوح في يرقات ذات الجناحين.

الإخراج Excretion

الإخراج هو التخلص من الفضلات الناتجة عن عمليات التحول الغذائي وخاصة الأزوتية منها بطردها خارج الجسم وتقوم أعضاء الإخراج بوظائفها كما يلي:

أ- أنابيب مليجي:

تقوم بطرد حمض البوليك الوارد إلى الدم من الأنسجة المختلفة وذلك عن طريق إتحاد هذا الحمض مع أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم

القاعدية مكوناً يورات صوديوم أو البوتاسيوم وأثناء دورة الدم حول هذه الأنابيب تستخلص منه هذه الأملاح في وجود الماء حيث تنفذ عن

طريق خلايا جدرها إلى تجويفها الداخلي وفي وجود ثاني أكسيد الكربون تتحول هذه الأملاح إلى بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم وحمض

البوليك، ثم يعاد امتصاص أملاح البيكربونات والماء مرة أخرى عن طريق جدار أنابيب مليجي وتعاد إلى الدم لتدخل مرة أخرى في الدورة

بينما تمر بلورات حمض البوليك من تجويف أنبوبة مليجي إلى تجويف المعى الخلفي ومنه إلى الخارج عن طريق فتحة الشرج وقبل التخلص

من البراز يعاد امتصاص الجزء الباقي من الماء عن طريق حلمات المستقيم ويعاد إلى الدم مرة أخرى.

حمض بوليك + أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم + ماء

يعاد امتصاصها

ماء+يورات صوديوم أو بوتاسيوم

حمض بوليك + ماء+بيكربونات صوديوم

إلى فتحة الشرج

إلى المعى الخلفي

ب- الأجسام الدهنية:

من المعروف أن الوظيفة الأساسية لهذه الأجسام هي تركيب وتخزين الغذاء الاحتياطي للحشرة إلا أنها لها وظيفة إخراجية، حيث

تظهر رواسب من حمض البوليك وأملاحه في الأجسام الدهنية لبعض الحشرات مثل الكولامبولات والصرصور الشرقي وفي هذه الحالة تكون

أنابيب ملبجي غائبة أو موجودة ولا تؤدي وظيفتها أو أنها غير قادرة على إفراز البولات. وتترسب البولات أو حمض البوليك نفسه فيما يعرف

بخلايا اليورات بالجسم الدهني ويعرف الإخراج في هذه الحالة بالتخزين الإخراجي حيث تنتقل هذه المواد الإخراجية المخزنة إلى أنابيب

ملبجي وقت التحول إلى طور العذراء والتخلص منها بعد ذلك.

ج- الخلايا الكلوية:

هذه الخلايا قادرة على امتصاص الحبيبات الغروية من الدم حيث تظهر بها البروتينات والكلوروفيل وبعض الأصباغ الأخرى. وتعتبر الكلويات من

أعضاء الإخراج المخزنة.

د- المعى:

قد يلعب المعى دوراً في عملية الإخراج حيث تتجمع بعض الأصباغ في خلايا جداره كما في حشرات الكولامبولات ، أو أن هذه الخلايا تستخلص

الأصباغ من الدم وتفرغها في تجويفه الداخلي كما يحدث لصبغة البليفردين الناتجة عن تحلل الهيموجلوبين كما في بقعة الرودنيس.

هـ- جدار الجسم:

تقوم بعض الحشرات بترسيب بعض نواتج عملية التمثيل الغذائي بجدار أجسامها وخاصة بعض الصبغات المشتقة من حمض البوليك

وأملحه كما في حالة أبو دقيق الكرنب، فتترسب هذه المواد في حراشيف أجنته مما يكسبها اللون الأبيض المصفر.